



Badanie polega na podaniu środka cieniującego - siarczanu barytu, - związek ten posiada właściwości pochłaniania promieniowania rentgenowskiego. Następnie wykonuje się zdjęcia rentgenowskie, które są praktycznie „odlewem „ kształtu zakontrastowanego przewodu pokarmowego. W czasie badania pasażu przewodu pokarmowego wykonuje się seryjnie zdjęcia co kilkadziesiąt minut, by uwidocznic wszystkie części przewodu pokarmowego aż do odbytnicy.

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza!!!

Przed wykonaniem badania pasażu przewodu pokarmowego, należy zastosować się do poniższych zaleceń.

- W dniu badania należy pozostawać **na czczo** - nie jeść i nie pić minimum 6 godzin przed badaniem – ostatni posiłek najlepiej spożyć najpóźniej ok. godz 19-tej dnia poprzedzającego badanie.
- Przed wykonaniem badania nie wolno palić papierosów ani żuć gumy. W dniu poprzedzającym badanie **nie należy** spożywać pokarmów ciężkostrawnych, wzdymających oraz napojów gazowanych.
- Pacjenci chorzy na cukrzycę są diagnozowani w pierwszej kolejności, aby mogli przyjąć leki i spożyć posiłek po badaniu.

Leki

- Doustne leki przyjmowane na stałe należy przyjąć po badaniu.

Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi

- Pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty informacyjne ze wcześniejszego leczenia .

Przeciwwskazania

- Cięża