



Wlew doodbytniczy jelita grubego polega na podaniu przez odbył środka cieniującego – siarczanu barytu, który wypełnia jelito grube, a następnie wykonuje się zdjęcia rentgenowskie, które są praktycznie odlewem jelita grubego.

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza!!!

Przed wykonaniem badania jelita grubego (wlewu doodbytniczego) należy stosować się do poniższych zaleceń:

- Od około tygodnia przed badaniem nie należy spożywać owoców pestkowych.
- Przez 3 doby przed badaniem należy stosować dietę płynną, bezresztkową (herbata z cukrem, galaretki, buliony). Jelito musi być oczyszczone, wtedy uzyskany obraz będzie wyraźny.
- Przeddzień badania i w dniu badania **nie należy** spożywać żadnych posiłków.
- Od około godziny 14.00 należy wypić preparat przeczyszczający Fortrans (preparat dostępny jest na receptę, którą wystawia lekarz kierujący na badanie. Przed zastosowaniem preparatu FORTRANS prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do preparatu). Przygotowujemy go rozpuszczając w wodzie w stosunku 1 saszetka na 1 litr. wody 4 litry preparatu Fortransu należy wypić w przeciągu 5-6 godzin. Smak roztworu można w razie potrzeby poprawić poprzez dodanie soku z cytryny. Preparatu nie można podawać osobom z niedrożnością jelit oraz z objawami zespołu ostrego brzucha.

Leki

- W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi

- Pacjent powinien dostarczyć dokumentację wcześniej wykonanych badań obrazowych i karty informacyjne ze szpitala.

Przeciwwskazania

- Cięża

Przebieg badania

Badanie trwa zazwyczaj 30-60 minut, do badania należy zdjąć odzież i założyć jednorazowy fartuch ochronny. W trakcie badania pacjent leży na lewym boku przed ekranem rentgenowskim, specjalnym cewnikiem podawana jest przez odbył papka barytowa i powietrze, które pozwalają uwidocznić ściany jelita. W czasie podania papki barytowej pacjent może odczuwać parcie na stolec. W trakcie badania, na prośbę lekarza, pacjent zmienia pozycje ciała, co pozwala na uwidocznienie całego jelita grubego. Następnie wykonywane są zdjęcia rentgenowskie. Kilka dni po badaniu pacjent obserwuje białą papkę w stolcu. Po badaniu należy spożywać przez kilka dni duże ilości płynów. Badanie jest bezbolesne.